


## Peuplier



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nom scientifique:                | <i>Populus alba</i> L.<br><i>Populus nigra</i> L.<br><i>Populus tremula</i> L.  |
| Autre nom vernaculaire:          | Peuplier blanc ( <i>P. alba</i> )<br>Peuplier noir ( <i>P. nigra</i> )<br>Tremble ( <i>P. tremula</i> )<br>Peuplier tremble ( <i>P. tremula</i> )   |
| Nom allemand:                    | Weisspappel ( <i>P. alba</i> )<br>Silberpappel ( <i>P. alba</i> )<br>Schwarzpappel ( <i>P. nigra</i> )<br>Alber ( <i>P. nigra</i> )<br>Aspe ( <i>P. tremula</i> )<br>Espe ( <i>P. tremula</i> )<br>Zitterpappel ( <i>P. tremula</i> ) |
| Nom italien:                     | Pioppo bianca ( <i>P. alba</i> )<br>Pioppo nero (albero) ( <i>P. nigra</i> )<br>Tremolo ( <i>P. tremula</i> )<br>Pioppo tremolo ( <i>P. tremula</i> )   |
| Nom romanche:                    | Trembel ( <i>P. tremula</i> )<br>Triembel ( <i>P. tremula</i> )   |
| Nom anglais:                     | Whith poplar ( <i>P. alba</i> )<br>Black poplar ( <i>P. nigra</i> )<br>Aspen ( <i>P. tremula</i> )  |
| Poids spécifique:                | anhydre: 0,40 ... 0,45 kg/dm <sup>3</sup><br>sec à l'air: 0,43 ... 0,49 kg/dm <sup>3</sup>  |
| Caractéristiques anatomiques:    | Aubier non distinct, blanc, duramen gris brun très clair avec des traînées gris brun foncé. Poreux diffus, grain fin à moyen, cernes bien marqués, fil droit.   |
| Caractéristiques technologiques: | Bois très tendre, fibreux, mou, aisé à façonner   |
| Durabilité:                      | champignons: nulle<br>classe de durabilité 5<br>insectes: nulle   |
| Utilisation:                     | Contreplaqué, placages de parements et de compensation, allumettes, laine de bois, boîtes et paniers de fruits, pâte à papier   |